

6か月～4歳用新型コロナワクチン個別接種の募集要項 (2023.3.20版)

堺市在住の生後6か月から4歳の方を対象に、ファイザー社の『コミュニティ筋注6か月～4歳用』を使用した新型コロナワクチン1・2・3回目接種を募集します。1回目接種日前日で5歳になる方は、5～11歳用のワクチンの対象です。1回目に6か月～4歳用ワクチンを接種後、2・3回目の接種日までに5歳となった場合は、6か月～4歳用ワクチンの接種を受けてください。

1・2回目の間隔は通常3週間、2・3回目の間隔は少なくとも8週間です。有効成分は12歳以上ファイザー社ワクチンの1/10量です。筋肉注射は同じです。1歳未満は太もも、1～2歳は太ももあるいは上腕、3歳以上は上腕となりますが、明らかに筋肉量が少ない場合等は年齢に関係なく太ももに接種することもできます。効果は、3回目接種後7日以降で発症予防効果が73.2%とあります。

<予約方法> 当科診療日の時間内に、電話で受付します。

<接種日> 水曜の13時からのワクチン専用時間帯の特定日を予定しています。

<使用ワクチンと量> 6か月～4歳用ファイザーワクチンを1・2・3回目とも0.2mLです
(有効成分としては、12歳以上のワクチンの1/10量になります)。

<1回目と2回目の間隔> 通常は3週間です。

<2回目と3回目の間隔> 少なくとも8週間です。

<接種当日に必要なもの>

- ①接種券付き予診票
- ②予防接種済証
- ③可能な限り、母子手帳
- ④本人確認書類(健康保険証や子ども医療証、マイナンバーカードなど)
- ⑤お薬手帳(現在お薬をもらっている方のみ)

注意点(1) 他のワクチンとは、インフルエンザワクチン以外の場合、前後とも13日以上の間隔が必要です。インフルエンザワクチンとコロナワクチンの組み合わせのみ、法律的には同時接種も可能です。

(2) 接種当日は肩や太ももを出しやすい服装を選んでください。

(3) 強い副反応が出ないか、ワクチン接種後15分以上(リスクが高い方は30分以上)、当科で滞在いただきます。

<副反応について>

年 齢	症 状 (発現割合: 1回目接種後→2回目接種後→3回目接種後)	
生後6か月～1歳	易刺激性	(※1) 51.2% → 47.4% → 43.6%
	食欲減退	22.2% → 22.2% → 20.2%
	傾眠状態	(※2) 27.0% → 23.8% → 19.9%
	圧痛	16.6% → 15.0% → 16.0%
2歳～4歳	疼痛	30.8% → 31.0% → 26.7%
	疲労	29.7% → 25.7% → 24.5%
	発赤	8.8% → 11.4% → 10.9%
	下痢	7.7% → 6.7% → 5.1%
	発熱	5.2% → 4.9% → 5.1%
	頭痛	4.5% → 4.6% → 4.9%
	腫脹	(※3) 3.7% → 5.7% → 3.1%
嘔吐	(※3) 3.9% → 3.9% → 2.7%	
悪寒	2.3% → 3.0% → 3.3%	
筋肉痛	2.4% → 2.6% → 2.0%	
関節痛	0.8% → 1.4% → 1.3%	

(※1) 不機嫌 (※2) 眠たくなる様子 (※3) 注射部位の腫れ

出典: 堺市HP『乳幼児(生後6か月～4歳)接種の概要』 更新日: 2022年10月25日、Pfizer HP『適正使用ガイド [コミュニティ筋注(1価:起源株)、コミュニティ筋注5～11歳用、コミュニティ筋注6か月～4歳用] 2022年10月作成(第1版)』、厚生労働省HP『新型コロナワクチン接種についてのお知らせ 生後6か月から4歳のお子様の保護者の方へ』

ワクチン実施日が少なく、日程変更は簡単
ではありませんので、予めご了承ください。
不要になりましたら、必ずキャンセルください。



(医) 医真会 あかざわ小児科
TEL 072-297-7771