



ヒアリ(火蟻・fire ant)にご注意を

毎日のようにヒアリについての報道がされ、厚生労働省からも医療機関に注意喚起の通知が届くようになってきました。ヒアリは世界の侵略的外来種ワースト100選定種で、日本の特定外来生物にも指定されているとあります。下記出典から、重要と思われるところをピックアップします。

①ヒアリの特徴

- ・日本の在来種と異なり、土で大きなアリ塚を作るのが特徴です。
- ・通常、アリ塚は農耕地や公園など、開放的な草地・裸地に作られます。
- ・攻撃性が強く、棒などでアリ塚をつつくと、集団で襲いかかってきます。
- ・小さいため他のアリと見分けるのは困難ですが、肉眼でもわかる特徴もあります。
 - A. 赤っぽくつやつやしている、B. 腹部(おしり)の部分が暗めの色、
 - C. 大きさは2.5~6mmで様々な大きさのアリが混在する

②ヒアリの症状

軽度/刺された部位の痛みやかゆみ

刺された瞬間は熱いと感じるような、激しい痛みが走ります。やがて、刺された痕がかゆくなります。10時間ほど経つと膿ができます。

中度/じんましん

刺されて数分から数十分後に刺された部分を中心に腫れが広がり、部分的、または全身にかゆみをとともなう発疹(じんましん)が現れることがあります。

重度/呼吸困難・血圧低下・意識障害

刺されて数分から数十分の間に息苦しさ、声がれ、激しい動悸やめまいなどを起こすことがあります。進行すると意識を失うこともあります。これらの症状が出た場合には重度の即時型のアレルギー反応「アナフィラキシー」である可能性が高く、処置が遅れると生命の危険も伴います。ヒアリの毒にはハチ毒と共通成分が含まれており、ヒアリに刺された経験がなくても、ハチ毒アレルギーを持つ方は特に注意が必要です。

③対処

●刺された直後の対処 20~30分程度は安静にし、体調の変化がないか注意しましょう。軽度の症状のみであり、症状が悪化する様子がなければ、ゆっくりと病院を受診しても大丈夫です。

●容体が急変したとき 症状は急速に進むので、とにかく一番近い病院を受診します(救急受け入れのある病院であればなお良い)。「アリに刺されたこと」「アナフィラキシーの可能性のあること」を伝え、すぐに治療してもらいます。

出典: 環境省自然環境局 野生生物課外来生物対策室発行『ストップ・ザ・ヒアリ』

環境省WEBサイト 広報チラシ『ヒアリに注意』大人用/こども用

<http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/fireant.html>

8月・担当医の変更と
夏季休診日のお知らせ

19日(土)午前診 片桐→赤澤

29日(火)午前診 赤澤→片桐


11日(金)から15日(火)にかけて、休診とさせていただきます。

2歳頃までの予防接種のスケジュール案


裏面に、2歳頃までの予防接種のスケジュール案を作りました。

2歳頃までの予防接種スケジュール案 ※必ずこの通りに進めていく必要はありません。

パターン1



パターン2



(注): ヒブ追加はヒブ③から7か月以上空いていること
肺炎球菌追加は肺炎球菌③から60日以上空いていること

医療法人 医真会 あかざわ小児科
平成29年8月1日