

# 予防接種一覧表

《定期接種》 公費で賄われます

ワクチン名	標準接種年齢 (定期接種対象年齢)	(接種開始年齢) 接種回数	標準的な間隔	次のワクチンまで空ける間隔	備 考
ヒブ (インフルエンザ菌b型)	2か月から (2か月～5歳未満)	(2か月～7か月未満) 初回3回+追加1回	4週から8週の間隔で3回、追加は3回目から7～13か月空けて、1歳以上で	6日間	初回接種が1歳までに終了していない場合、最後から27日以上空けて追加を1回行う。
		(7か月～1歳未満) 初回2回+追加1回	4週から8週の間隔で2回、追加は2回目から7～13か月空けて		
		(1歳～5歳未満) 1回			
肺炎球菌 (PCV13)	2か月から (2か月～5歳未満)	(2か月～7か月未満) 初回3回+追加1回	27日以上の間隔で3回(2歳までに完了のこと)、追加は3回目から60日以上空けて1歳から1歳3か月で	6日間	初回2回目が1歳を超えたら3回目は行わない。初回2回目3回目が2歳を超えるなら、行わない。ともに追加接種可。
		(7か月～12か月未満) 初回2回+追加1回	27日以上の間隔で2回(2歳までに完了のこと)、追加は2回目から60日以上空けて1歳以降に		
		(12か月～24か月未満) 2回	60日以上空けて		
		(24か月～5歳未満) 1回			
B型肝炎	2か月から (1歳未満)	初回2回+追加1回	1回目と2回目の間は4週以上、1回目と3回目の間は20週以上(かつ1歳未満で完了のこと)	6日間	
四種混合 (DPT-IPV)	3か月から (3か月～7歳6か月)	初回3回+追加1回	3～8週の間隔で3回、追加は3回目から1年～一年半後	6日間	初回終了から追加まで最低6か月以上
不活化ポリオ	3か月から (3か月～7歳6か月)	初回3回+追加1回	3週間以上の間隔で3回、追加は3回目から1年～一年半後	6日間	初回終了から追加まで最低6か月以上
BCG	5か月～8か月未満 (1歳未満)	1回		27日間	堺市は集団接種
MR 麻疹・風疹	I 期 1歳～2歳未満の間に1回 II 期 5歳～7歳未満の小学校就学前の1年間に1回			27日間	
水痘	初回を1歳～1歳3か月 (1歳～3歳未満)	2回	2回目は1回目から6か月～1年後	27日間	水痘にかかった方は対象外。2回の間隔の最短は3か月
日本脳炎 I 期	初回2回を3歳以上4歳未満に 追加を4歳以上5歳未満に (6か月～7歳6か月未満)	初回2回+追加1回	1回目と2回目の間は6～28日間、追加は2回目から概ね1年後	6日間	初回終了から追加まで最低6か月以上
日本脳炎 II 期	9歳以上10歳未満に (9歳～13歳未満)	1回		6日間	
①日本脳炎ワクチンに関しては、2005年5月からの積極的勧奨の差し控えを受けて、特定対象者(平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれ)は、20歳未満まで定期接種の対象 ②平成19年4月2日から平成21年10月1日生まれは3歳以上7歳6か月までのI期と9歳以上13歳未満のII期を使って合計4回接種してください。③平成21年10月2日生まれ以降は、3歳以上7歳6か月未満に3回、9歳以上13歳未満に1回。					
二種混合 II 期(DT)	11歳以上12歳未満に (11歳～13歳未満)	1回		6日間	
子宮頸がん (サーバリックス®)	12歳～16歳	3回	1回目と2回目の間は1か月、1回目と3回目の間は6か月	6日間	当院では取り扱っておりません

## 《任意接種》

ワクチン名	接種年齢	接種回数	間 隔	次のワクチンまで空ける間隔	料 金 (税込み)
B型肝炎	任意としては1歳以上	初回2回+追加1回	1回目と2回目の間は4週間、2回目と3回目の間は20～24週間	6日間	1回5,000円
ロタ (ロタリックス®※)	生後6週から 15週未満に1回目	2回	4週間以上 ただし生後24週未満までに完了	27日間	1回13,000円
水痘	任意接種として3歳以上		水痘にかかった方は不要。13歳未満は3か月以上空けて、計2回を推奨。13歳以上は4週間以上空けて、計2回を推奨。	27日間	1回7,000円
おたふくかぜ	1歳以上		1歳を過ぎたら早期に1回目、2回目をMRワクチンのII期と同時期(5歳以上7歳未満の就学前の1年間に)推奨	27日間	1回5,000円
インフルエンザ 平成27年秋より、 3価から4価に変更されました。	6か月以上	(6か月から12歳まで) 2回	2～4週間後に2回目 4週間後頃が望ましい	6日間	1回目 3,000円 2回目 3歳未満:2,500円 3歳以上:3,000円 (当院で1回目を受けておられない3歳未満の2回目は3,000円いただきます。)
		(13歳以上) 1回(受験生は希望で2回)	2回目をするなら、1～4週間後 4週間後頃が望ましい		
肺炎球菌※※ (PCV13)	定期接種でPCV7 を終了した6歳未満	最後の接種から8週間以上を空けてPCV13での 追加接種を1回(一度もPCV13で摂取していない希望の方)		6日間	1回12,000円

三種混合ワクチンは製造中止になっていましたが、2018年1月29日から販売が再開されました。

※当院で5価ロタウイルスワクチン(ロタテック®)は取り寄せになります。ロタテックは3回接種が必要です。予約時にお申し出ください。

※※2013年10月までの肺炎球菌ワクチン(PCV7)は7価(7種類の株に対するワクチン)で、11月1日から13価に切り替えられました。